

- 1 Amerikanische Klettertrompete** *Campsis radicans* (L.) SEEM.
 Bis 6(–10) m Mai–September ☞ **Trompetenbaumgewächse Bignoniaceae**
Merkmale Sommergrüne Kletterpflanze, wie die folgenden Trompetenbaumgewächse ohne Ranken, Blätter gegenständig, unpaarig gefiedert, hier mit 9–11 eiförmig-lanzettlichen, gesägten Blättchen. Blütenkrone 4–5 cm breit, scharlachrot, über dem Kelch erweitert, mit 5 rundlichen, ungleichen Lappen. Heimat N-Amerika. In Kultur oft die Hybride mit *C. grandiflora* (THUNB.) SCHUM. aus China, mit 7–9 kahlen Fiedern.

- 2 Jacaranda**, Falscher Palisander *Jacaranda mimosifolia* D. DON. (*J. ovalifolia* R. BR.)
 Bis 15 m Mai–Oktober ☞ **Trompetenbaumgewächse Bignoniaceae**
Merkmale Laubwerfender, zur Blütezeit oft kahler Baum, die doppelt unpaarig gefiederten Blätter mit bis zu 31 lanzettlichen, in eine grannige Spitze verschmälerten, oberseits behaarten Blättchen. Große rispige Blütenstände, Krone etwa 5 cm lang, blauviolett mit weißem Schlund, die Röhre 2-lippig mit 5 rundlichen, abstehenden Lappen. Verholzende, flache, rundliche Kapseln. Heimat Argentinien, Bolivien.

- 3 Weitschlundige Bignonie** *Podranea ricasoliana* (TANF.) SPRAG.
 3–10 m April–Juli ☞ **Trompetenbaumgewächse Bignoniaceae**
Merkmale Kräftiger, immergrüner, kahler Kletterstrauch. Blätter mit 7–11 eiförmigen, zugespitzten, ganzrandigen bis stumpf gesägten Fiedern. Blüten in reichen, lockeren, endständigen Rispen, Krone über dem Kelch plötzlich glockig erweitert, rosa mit dunkleren Adern und bräunlich gelbem Schlund, etwas 2-lippig, mit 5 rundlichen Lappen, 7–8 cm lang und breit. Bis 40 cm lange, zylindrische Kapseln. Heimat S-Afrika.

- 4 Gelber Trompetenbaum** *Tecoma stans* (L.) KUNTH
 6–9 m März–September ☞ **Trompetenbaumgewächse Bignoniaceae**
Merkmale Immergrüner oder laubwerfender Strauch bis kleiner Baum, die 3–9 Fiederblätter eilanzettlich, spitz oder zugespitzt, am Rand deutlich gesägt. Blüten 3,5–8,5 cm lang, mit plötzlich trichterförmig erweiterter, goldgelber Krone, der ausgebreitete 5-lappige Saum nur schwach 2-lippig, Schlund und obere Lappen meist rot geadert. Lineale, zugespitzte, bis 25 cm lange Kapseln. Heimat Mexiko bis Peru.

- 5 Kap-Bignonie** *Tecomaria capensis* (THUNB.) SPACH. (*Tecoma capensis* (THUNB.) LINDL.)
 2–5(–7) m März–Oktober ☞ **Trompetenbaumgewächse Bignoniaceae**
Merkmale Immergrüner kahler Kletterstrauch oder Baum, die 7–11 dunkelgrünen, glänzenden Fiederblätter eiförmig, gesägt, die unteren gestielt. Blüten endständig zu 6–8, mit leicht gekrümmter, 3,5–5,5 cm langer, schmal trichterförmiger, deutlich 2-lippiger Krone, im Schlund orangefarben oder scharlachrot, Staubblätter herausragend. Lineale, zusammengedrückte, 7–12 cm lange Kapseln. Heimat S-Afrika.

- 6 Kokonseidenbaum**, Florettseidenbaum *Chorisia speciosa* A. ST.-HILAIRE
 4–10(–25) m Oktober–Dezember ☞ **Wollbaumgewächse Bombacaceae**
Merkmale Laubwerfender, zur Blütezeit ± kahler Baum, der wasserspeichernde Stamm auffällig durch dicke, spitze Stacheln (6a). Blätter fingerförmig 6–7-zählig mit gezähnten Blättchen. Blüten über 10 cm breit, mit 5 freien, rosa bis weinroten, unten gelben, ± gestrichelten Kronblättern und einer weit herausragenden Staubblattsäule (6b). Fruchtkapsel innen mit Haaren, darin eingebettet die Samen. Heimat S-Amerika.

- 7 Buntfarbene Bauhinie** *Bauhinia variegata* L.
 6–12 m Februar–Mai ☞ **Johannisbrotgewächse Caesalpiniaceae**
Merkmale Laubwerfender Strauch oder kleiner Baum. Blätter rundlich, kahl, vorne etwa zu 1/3 eingeschnitten. Blüten orchideenartig auffällig („Orchideenbaum“), mit einseitig geöffnetem, scheidigem Kelch und 5 ausgebreiteten, 4–6 cm langen Kronblättern, davon das oberste vorstehend, kräftiger purpur und dunkler geadert als die 4 blasseren seitlichen. Heimat Indien, China, SO-Asien.

